

V Mariboru, 5. 3. 2026

KRATKA NAVODILA PRI GNOJENJU IN VARSTVU RASTLIN NA VVO I

GNOJENJE:

Na vseh vodovarstvenih območjih lahko gnojite le **na podlagi gnojilnih načrtov**, ki so narejeni na podlagi analize tal. **Gnojilni načrt** mora biti izdelan v pisni obliki in mora biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora najmanj podatke **o vrsti in količini uporabljenega mineralnega ali organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino in okvirni čas gnojenja**. Uležan hlevski gnoj se lahko shrani na kmetijskih zemljiščih največ 2 meseca, **100 m vstran od vodnega zajetja**, ter 25 m vstran od tekočih voda, **vendar ne na VVO I. Na VVO I je prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko in preoravanje trajnega travinja**. Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na VVO I letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja **ne sme presegati 140 kg N/ha, (do 30 m³/ha)**. **Mineralna gnojila**, ki vsebujejo dušik, se **na VVO I lahko uporabljajo po 1. marcu**.

Preglednica 1: Največja dovoljena količina dušika **na VVO I** ne sme presegati naslednje vrednosti:

	ZAČETNO GNOJENJE Z DUŠIKOM	DOGNOJEVANJE - enkratni vnos	OPOMBE
OKOPAVINE	do 30 kg N/ha	do 80 N kg/ha	Obvezen talni test pred dognojevanjem!!
OZIMINE	jeseni ni dovoljeno	spomladi do 60 kg N/ha	
TRAJNO TRAVINJE, TDM		do 50 kg N/ha za vsako košnjo	
ZELENJADNICE	do 40 kg N/ha	do 60 kg N/ha	
TRAJNI NASAD		do 60 kg N/ha	

Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih (VVO II in VVO III) se gnojenje kmetijskih zemljišč z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, mora izvajati tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega **60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha**.

VARSTVO RASTLIN:

Za zatiranje škodljivih organizmov na VVO I se lahko uporabljajo FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama prepovedanih, uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS. **Prepovedane so naslednje aktivne snovi:** bentazon, dikamba, dikloprop-p, dimetaklor, dimetenamid, flufenacet, flurokloridon, klopuralid, klorantraniliprol, MCPA, mekoprop-p (mcpp-p), metalaksil/metalaksil-M, metamitron, metazaklor, metribuzin, nikosulfuron, petoksamid, rimsulfuron, S-metolaklor, terbutilazin, tritosulfuron. Obširna navodila so na naši spletni strani!

Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda, dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter **na vodenje evidenc o uporabi fitofarmaceutskih sredstev**, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.

Kmetijska svetovalna služba:
Specialistka za varstvo rastlin
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet.