




V Mariboru, 10. 4. 2026

## ZATIRANJE GLIVIČNIH BOLEZNI NA JEČMENU

Glavne bolezni na ječmenu so **ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, ramularijska pegavost ječmena:**



Slika 1: Čas uporabe fungicidov v ječmenu (vir: Smernice integriranega varstva strnih žit)

**V primeru 2 kratnega škropljenja:**

**PRVO ŠKROPLJENJE**, v fazi sredine kolenčenja 1- 2 kolence, za ječmenovo mrežavo pegavost in listni ožig lahko uporabite:

- 1,4 l/ha **Amistar era** (azoksistrobin+ protiokonazol) ali,
- 1,2 l/ha **Ascra xpro** (bixafen+fluopiram+protiokonazol) ali,
- 1,25 l/ha **Avastel** (fluksapiroksad + protiokonazol) ali
- 1,24 l/ha **Input** (protiokonazol + spiroksamin).

Če ne bo premočega pritiska bolezni, če bo bolj suho vreme, lahko uporabite pripravke le na osnovi **tebukonazola**, kot so: **Folicur EW 250 1 l/ha, Tebusha 25 %EW 1 l/ha, Tebkin 1 l/ha, Orius 25 EW 1 l/ha, Bounty 0,6 l/ha, Buzz ultra DF 0,33 kg/ha.**

**DRUGO ŠKROPLJENJE**, v fazi pojava resic, za ramularijsko pegavostjo, svetujemo uporabo fungicidov:

- 1 l/ha **Elatus era** (benzovindiflupir+ protiokonazol)+ Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žvepljen pripravek 5 kg /ha ali,




- **1,2 l/ha Ascra xpro** (biksafen+ protiokonazol+ fluopiram)+ Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha
- **1,5 /ha Revycare** (mefentriflukonazol + piraklostrobin) + Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha
- **1,5 L/ha Navura** (protiokonazol + mefentriflukonazol) + Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha
- **1,5 L/ha Delaro forte** (protiokonazol+ spiroksamin+ trifloksistrobin) + Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha
- **1 l/ha Cayunis** (bixafen+ trifloksistrobin+spiroksamin)+ Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha

## ZATIRANJE GLIVIČNIH BOLEZNI NA PŠENICI

Priporočila po Top agraru 1/2026!

V fazi kolenčenja pšenice se pojavijo naslednje bolezni: **pšenične listne pegavosti, žitna pepelovka, rje, temna pegavost pšenice...** V klasenju pa **fusarium**.



Slika 2: Čas uporabe fungicidov v pšenici (vir: Smernice integriranega varstva strnih žit)

### V primeru 3 kratnega škropljenja:

PRVO ŠKROPLJENJE, v fazi 2-3 kolenca, za delovanje na rjo, septorijo, pepelovko in temna pegavost. Če je bil predposevek pšenica in je večji pritisk bolezni (vlažno, toplo) uporabite boljše pripravke, sestavljene z več aktivnih snovi, malo znižani odmerki:

- **1,25 l/ha Revycare** (piraklostrobin + mefentriflukonazol) ali,



- 
- **0,8 l/ha Verben** (prokvinazid+protiokonazol) ali,
  - **0,8 l/ha Input** (protiokonazol+ spiroksamin).

Če ne bo premočega pritiska bolezni, če bo bolj suho vreme, in če ste imeli predposevek okopavine, lahko uporabite pripravke le na osnovi **tebukonazola**, kot so: **Folicur EW 250 1 l/ha, Tebusha 25 %EW 1 l/ha, Tebkin 1 l/ha, Orius 25 EW 1 l/ha, Bounty 0,6 l/ha, Buzz ultra DF 0,33 kg/ha** s kombinacijo s strobilurinskimi pripravki.

**DRUGO ŠKROPLJENJE**, v fazi pojava celotnega lista zastavičarja do vidnih prvih resic oz. klasa, za delovanje na rjo, septorijo, pepelovko in temna pegavost svetujemo uporabo fungicidov:

- **0,6 l/ha Elatus era** (benzovindiflupir+ protiokonazol) + **0,2 l/ha Prosaro** (protiokonazol + tebukonazol) + **1,5 l/ha Folpan 500 SC** ali
- **0,8 l/ha Ascra xpro** (bixafen+fluopiram+protiokonazol) + **1,5 l/ha Folpan 500 SC** ali
- **0,9 l/ha Revytrex** (fluksapiroksad+ mefentriflukonazol) + **1,5 l/ha Folpan 500 SC**.

**TRETJE ŠKROPLJENJE**, v fazi cvetenja pred napovedanimi padavinami, za delovanje pri visokem pritisku fusariuma, svetujemo uporabo fungicidov:

- **1 l Sirena** (metkonazol) + **0,5 l/ha Protendo** (protiokonazol) + močilo ali
- **0,5 l/ha Protendo** (protiokonazol) + **0,5 l/ha Folicur** (tebukonazol) ali
- **1 l/ha Prosaro** (protiokonazol + tebukonazol) ali
- **1,5 l/ha Navura** (protiokonazol+mefentriflukonazol) .

Pri nizkem pritisku bolezni fusarium (če bo suho vreme): **1 l/ha Magnello** (difenokonazol+tebukonazol).

Kmetijska svetovalna služba:  
Marjeta Miklavc, univ. dipl. inž. kmet.;  
Specialistka za varstvo