

V Mariboru, 6. 3. 2025

OBVESTILO O ZATIRANJU KLJUNOTAJEV NA OLJNI OGRŠČICI

V SV Sloveniji je oljna ogrščica v fazi podaljševanja stebela. Zaradi višjih dnevnih temperatur se je populacija kljunotaja povečala in na nekaterih lokacijah že presega pragove škodljivosti. Preverite posevke oljne ogrščice.

PRAGOVİ ŠKODLJIVOSTI pri kljunotajih so:

- velik Ogrščični (repični) kljunotaj (*Ceutorhynchus napi*): **5 hroščev/posodo na 3 dni;**
- majhen Stebelni kapusov kljunotaj (*Ceutorhynchus quadrienz*): **15 hroščev/posodo/ 3 dni.**

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh. V kolikor imate v vaših posevkih presežen prag škodljivosti priporočamo zatiranje kljunotajev.

Pri uporabi piretroidov naj pH škropilne brozge okoli 5,5 – 6,2. Za dobro delovanje fungicidov naj bodo dnevne temperature zraka nad 10°C, bolje okoli 15°C.

Preglednica 1: Število kljunotajev v rumenih posodah in na ploščah po posameznih lokacijah

Število kljunotajev v rumeni posodi in na rumeni plošči									
	SV. TROJICA	SPODNJA KORENA	SP. POLSKAVA	ORMOŽ (MIHOVCI) - OTOK3	ORMOŽ - OBREŽ LEVO	SREDIŠČE OB DRAVI, DRENAŽA 1	Murska Sobota Lipovci	Murska Sobota Gančani	Cirkovce
24.01.2025	POSTAVITEV POSOD IN PLOŠČ								
26.01.2025	26.01.2025 POSTAVITEV PLOŠČ/POSOD								
27.01.2025							1 kljunotaj	3 kljunotaji	
28.01.2025	1 kljunotaj	1 kljunotaj	0						
29.01.2025				2+ 2 kljunotaja	6 kljunotajev	6 kljunotajev	3 kljunotaji	6 kljunotajev	
31.01.2025	14 kljunotajev	5 kljunotajev	0						
3.02.2025				17+20 kljunotajev	13 kljunotajev	8 kljunotajev	3 kljunotaji	3 kljunotaji	3 kljunotaji
6.02.2025				0	0	0			
7.02.2025	1 kljunotaj	1 kljunotaj	1 kljunotaj				2 kljunotaja		
10.02.2025				0	0	0			
11.02.2025	0	0	0						4 kljunotaji
20.02.2025				0	0	0			
25.02.2025	1 kljunotaj	0	4 kljunotaji						
28.02.2025				0	0	0		2 kljunotaja	
3.03.2025				1 kljunotaj		0 1 kljunotaj	3 kljunotaji		
5.03.2025	10 kljunotajev	12 kljunotajev	4 kljunotaji	10+2 kljunotaja	12 kljunotajev	32 kljunotajev			

Podatke o ulovu škodljivcev in o fenofazah lahko najdete na Agrometeorološkem portalu:

<https://agromet.mkgp.gov.si/APP2/Zoo?archive=0&graphs=1>

Preglednica 2: Seznam insekticidov registriranih za oljno ogrščico

SREDSTVO	ODMEREK	ČAS UPORABE	REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE
PIRETROIDI TIPA I			
Evure (tau-fluvalinat 24%)	0,2 L/ha	Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti.	-za zatiranje repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> , <i>C. picatoris</i>), repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>), redkvinega kljunotaja (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) in kapusove luskove hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>).
Mavrik 240 EW (tau-fluvalinat 24%)	0,2 L/ha	Insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode.	- za zatiranje repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> , <i>C. picatoris</i>), repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>), redkvinega kljunotaja (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) in kapusove luskove hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>).
PIRETROIDI TIPA II			
Decis 2,5 EC (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	Dotikalni insekticid, s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci.	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in drugih škodljivcev .
Decis 100 EC (deltametrin 10 %)	75 ml/ha	Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti.	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) ter za zmanjševanje populacije repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i>), luskovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), kapusove luskove hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>) in repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>).
Delux 050 CS (deltametrin 5 %)	0,1 L/ha	S sredstvom se tretira ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti.	-za zatiranje repičarja (<i>Brassicogethes aeneus</i>) in stebelnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>).
Karate zeon 5 CS (lambda-cihalotrin 5%)	0,15 L/ha	Dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.	- za zatiranje listnih uši (<i>Aphididae</i>), kljunotaj (<i>Ceutorhynchus spp.</i>) in repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk.
Poleci (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	Dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe.	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in drugih škodljivcev .

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel **ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.**

Kmetijska svetovalna služba:
Specialistka za varstvo rastlin
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet.