

V Mariboru, 5. 10. 2026

OBVESTILO O UPORABI HERBICIDA BELKAR V OLJNI OGRŠČICI

V SV Sloveniji je oljna ogrščica **v fazi dveh pravih listov**. V tej fazi do faze štirih pravih listov ogrščice je pravi čas za uporabo herbicida Belkar.


Sredstvo BELKAR se uporablja v **ozimni oljni ogrščici** v času po vzniku plevla in oljne ogrščice za zatiranje **enoletnega širokolistnega plevla**:

a) v deljenem odmerku:

- **0,25 L** na ha pri porabi 200 do 400 L vode na ha. Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko sta **dva lista razvita (BBCH 12), do fenološke faze, ko so razviti štirje listi (BBCH 14);**

- v primeru, da se ponovno pojavijo plevli, se tretiranje ponovi v odmerku 0,25 L na ha, pri čemer naj bo minimalni presledek med tretiranjema 14 dni,

b) ali v enkratnem odmerku 0,5 L na ha pri porabi 200 do 400 L vode na ha. Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko je šesti list razvit (BBCH 16), do fenološke faze, ko je osmi list razvit (BBCH 18).



Slika 1: Oljna ogrščica v fazi dveh pravih listov, foto: M. Miklavc



Slika 2: Oljna ogrščica v fazi dveh pravih listov in samosevci žit, foto: M. Miklavc

Če imate v oljni ogrščici prisotne samosevce žit, (tudi zaradi toče, ker je zrnje ječmena in pšenico padlo na tla ter je vzniklo), priporočamo uporabo enega izmed graminicidov: **Agil 100 EC, Alive, Quick 5 EC, Focus ultra, Frequent, Fusilade forte, Fusilade max, Select super, Targa super, Wish top.**

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel **ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.**

Kmetijska svetovalna služba:
Specialistka za varstvo rastlin
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet.