

V Mariboru, 22. 4. 2026

OBVESTILO O ZATIRANJU RAMULARIJSKE PEGAVOSTI JEČMENA

V SV Sloveniji so **ječmeni** v fazi začetek klasenja do pojava prvih resic odvisno od sorte, kar je primeren čas za preventivno varstvo pred **ječmenovo ramularijsko pegavostjo**. Priporočamo uporabo primernih fungicidov skupaj s kombinacijo s Folpanom ali žvepleni pripravki.

Škropljenje ječmena v fazi pojava resic, za ramularijsko pegavostjo, svetujemo uporabo fungicidov:

- **1 l/ha Elatus era** (benzovindiflupir+ protiokonazol)+ Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha ali,
- **1,2 l/ha Ascra xpro** (biksafen+ protiokonazol+ fluopiram)+ Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha
- **1,5 /ha Revycare** (mefentriflukonazol + piraklostrobin) + Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha
- **1,5 L/ha Navura** (protiokonazol + mefentriflukonazol) + Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha
- **1,5 L/ha Delaro forte** (protiokonazol+ spiroksamin+ trifloksistrobin) + Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha
- **1 l/ha Cayunis** (bixafen+ trifloksistrobin+spiroksamin)+ Folpan 500 SC 1,5 l/ha ali žveplen pripravek 5 kg /ha

Pred uporabo posameznih fitofarmaceutskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmaceutskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta za vključene v KOPOP pa pet let. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

Kmetijska svetovalna služba:
Marjeta Miklavc, univ. dipl. inž. kmet.;
Specialistka za varstvo