



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor  
tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82  
E-pošta: [info@kmetijski-zavod.si](mailto:info@kmetijski-zavod.si),  
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

---

V Mariboru, 29. 6. 2021

## OBVESTILO O VARSTVU OLJNIH BUČ PRED LISTNIMI UŠMI IN BOLEZNIMI

Olje buče so v fenološki fazi razvoja vrež in razvoja socvetij (BBCH 205/501). Na nekaterih posevkah oljnih buč se še vedno pojavljajo listne uši, zato priporočamo, da posevke pregledate. V primeru, da so listne uši prisotne, priporočamo uporabo insekticidov kot so Mospilan 20 SG v odmerku 0,125 – 0,15 kg/ha ob porabi vode 500 do 600 L/ha ali Teppeki in Afinto oba v odmerku 0,1 kg/ha pri porabi vode 600 do 1000 L/ha ali Neemazal T/S v odmerku 2,0 L/ha pri porabi vode 600 L/ha. Upoštevajte največje možno število tretiranj s posameznim pripravkom.

Na oljnih bučah se lahko pojavijo bolezni kot so **plesni bučnic** (*Pseudoperonospora cubensis*), **pepelovka bučnic** (*Erysiphe polyphaga*), glive iz rodu **Didymella** ...

Za zatiranje plesni bučnic, nevarnost se bo povečale ob pojavu padavin, lahko uporabimo pripravek na podlagi AL-fosetila (Aliette flash 4kg/ha), v obdobju dokler se je še možno voziti med vrežami ali Cuprablau Z 35 WG (1x letno, 1,5 kg/ha; baker v obliki bakrovega oksida). Priporočamo, da pregledate posevke oljnih buč in po potrebi uporabite enega izmed fungicidov.

Za pepelovko buč so registrirani pripravki: Mavita 250 EC (0,5 l/ha) ali Score 250 EC (0,5 l/ha) (difenokonazol), Sercadis plus (0,6 l/ha; difenokonazol + fluksapiroksad), Vitisan (1,5 – 3 kg/ha; kalijev hidrogen karbonat), Velum prime (0,625 l/ha; fluopiram), Biotip sulfo 800 SC, Cosan, Kumulus DF, Microthiol SC, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG (močljivo žveplo), Sonata (*Bacillus pumilus*, zaščiteni prostori), AQ-10 (35 g/ha; *Ampelomyces quisqualis*) in Serenade Aso (*Bacillus amyloliquefaciens*). Pepelovka povzroča slabo polnjenje semen pri plodovih razvitih iz bolj pozno oplojenih cvetov.

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.**

Kmetijska svetovalna služba:  
Marjeta Miklavc, univ. dipl. inž. kmet.  
Specialistka za varstvo rastlin