

V Mariboru, 17. 2. 2026

OBVESTILO O SPREMLJANJU KLJUNOTAJEV NA OLJNI OGRŠČICI

V SV Sloveniji oljna ogrščica začenja z rastjo, temperature tal se dvigajo, dnevne temperature sicer nihajo, pričakujemo lahko nalet prvih kljunotajev na posevkih oljne ogrščice.

Svetujemo postavitev rumenih posod z vodo in detergentom oziroma rumenih lepljivih plošč, pregledujemo jih na tri dni in če je prag škodljivosti presežen, bo potrebno ukrepanje z insekticidi.

PRAGOVI ŠKODLJIVOSTI pri kljunotajih so:

- velik Ogrščični (repični) kljunotaj (*Ceutorhynchus napi*): 5 hroščev/posodo na 3 dni;
- majhen Stebelni kapusov kljunotaj (*Ceutorhynchus quadrienz*): 15 hroščev/posodo/ 3 dni.

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh. V kolikor imate v vaših posevkih presežen prag škodljivosti priporočamo zatiranje kljunotajev.

Pri uporabi piretroidov naj bo pH škropilne brozge okoli 5,5 – 6,2.

Rumeno posodo z vodo in detergentom postavite 20 od roba njive, ali postavite rumeno lepljivo plošče za spremljanje kljunotajev na oljni ogrščici !



Preglednica 1: Seznam insekticidov registriranih za oljno ogrščico

SREDSTVO	ODMEREK	ČAS UPORABE	REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE
PIRETROIDI TIPA I			
Evure (tau-fluvalinat 24%)	0,2 L/ha	Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti.	-za zatiranje repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> , <i>C. piciparsis</i>), repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>), redkvinega kljunotaja (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) in kapusove luskove hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>).
Mavrik 240 EW (tau-fluvalinat 24%)	0,2 L/ha	Insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode.	- za zatiranje repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> , <i>C. piciparsis</i>), repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>), redkvinega kljunotaja (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) in kapusove luskove hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>).
PIRETROIDI TIPA II			
Decis 2,5 EC (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	Dotikalni insekticid, s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci.	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in drugih škodljivcev .
Decis 100 EC (deltametrin 10 %)	75 ml/ha	Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti.	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) ter za zmanjševanje populacije repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i>), luskovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), kapusove luskove hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>) in repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>).
Delux 050 CS (deltametrin 5 %)	0,1 L/ha	S sredstvom se tretira ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti.	-za zatiranje repičarja (<i>Brassicogethes aeneus</i>) in stebelnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>).
Karate zeon 5 CS (lambda-cihalotrin 5%)	0,15 L/ha	Dotikalni insekticid z želodčnim in odvrčnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.	- za zatiranje listnih uš (Aphididae), kljunotaj (<i>Ceutorhynchus spp.</i>) in repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk.
Poleci (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	Dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe.	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in drugih škodljivcev .
Scatto (deltametrin 2,5%)	0,2 - 0,3 L/ha	Sistemični, kontaktni insekticid. Na istem zemljišču je dovoljeno oljno ogrščico ter repico tretirati največ enkrat v eni rastni sezoni.	- za zatiranje repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>), za zmanjševanje populacije brazdastega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>) ter za zmanjševanje populacije repičarja (<i>Brassicogethes aeneus</i>).

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel **ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.**

Kmetijska svetovalna služba:
Specialistka za varstvo rastlin
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet.