

V Mariboru, 20. 2. 2024

OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI

Oljna ogrščica je v SV Sloveniji v fazi podaljševanje stebila. Ulove kljunotajev redno spremljamo, podatki so prikazani v spodnji preglednici. Na opazovanih mestih se lovi majhen Stebelni kapusov kljunotaj .

Pragovi škodljivosti so na nekaterih lokacijah preseženi!

PRAGOVİ ŠKODLJIVOSTI pri kljunotajih so:

- velik Ogrščični (repični) kljunotaj (*Ceutorhynchus napi*): **5 hroščev/posodo na 3 dni;**
- majhen Stebelni kapusov kljunotaj (*Ceutorhynchus quadrienz*): **15 hroščev/posodo/ 3 dni.**

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh. V kolikor imate v vaših posevkih presežen prag škodljivosti priporočamo zatiranje kljunotajev.

Preglednica 1: Število kljunotajev v rumeni posodi in na rumeni plošči									
	Pesnica	Pragersko	Spodnji Duplek	Lenart	Ormož - otok 5	Ormož - Loperšiče	Ormož - Zgornja Dobrava	Murska Sobota	Cirkovce
1.02.2024	POSTAVITEV POSOD IN PLOŠČ								
5.02.2024	32 kljunotajev	13 kljunotajev	24 kljunotajev	28 kljunotajev		POSTAVITEV PLOŠČ/POSOD		76 kljunotajev	12 kljunotajev
6.02.2024						76 kljunotajev	30 kljunotajev		
9.02.2024	85 kljunotajev	2 kljunotaja* (plošča na tleh)	100 kljunotajev	97 kljunotajev	70 kljunotajev				1 kljunotaj
12.02.2024									3 kljunotaji
13.02.2024	6 kljunotajev	1 kljunotaj	3 kljunotaji	10 kljunotajev				33 kljunotajev	
15.02.2024					15 kljunotajev	8 kljunotajev	8 kljunotajev		
16.02.2024									6 kljunotajev
18.02.2024					22 kljunotajev	10 kljunotajev	16 kljunotajev		
19.02.2024	32 kljunotajev	18 kljunotajev	26 kljunotajev	31 kljunotajev				29 kljunotajev	

Kljunotaje je potrebno zatreti v nekaj dneh, ko je presežen prag škodljivosti. **Pri piretroidih upoštevamo pH škropilne brozge, ki naj okoli 5,5 - 6,5,** za zatiranje kljunotajev priporočamo piretroide iz II. skupine. Priporočamo, da poškropite v večerno nočnem času.

Preglednica 2: Seznam insekticidov registriranih za oljno ogrščico

SREDSTVO	ODMEREK	ČAS UPORABE	REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE
PIRETROIDI TIPA I			
Evure (Tau-fluvalinat 24%)	0,2 L/ ha	Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti	za zatiranje repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> , <i>C. picitarsis</i>), repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>), redkvinega kljunotaja (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) in kapusove luskove hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>).
Mavrik 240 EW (tau-fluvalinat 24%)	0,2 L na ha	insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode	- za zatiranje repičnega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus napi</i>), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus quadridens</i> , <i>C. picitarsis</i>), repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>), redkvinega kljunotaja (<i>Ceuthorhynchus assimilis</i>), repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>) in kapusove luskove hrčice (<i>Dasyneura brassicae</i>)
PIRETROIDI TIPA II			
Decis 2,5 EC (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	dotikalni insekticid, s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in drugih škodljivcev
Decis 100 EC (deltametrin 10 %)	63 ml - 75 ml/ha	Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in za zatiranje repičnega bolhača (<i>Psylliodes chrysocephala</i>)
Delux 050 CS (deltametrin 5 %)	0,1 l/ha	Tretiranje se opravi, ko je presežen prag škodljivosti	-za zatiranje repičarja (<i>Brassicogethes aeneus</i>) in stebelnega kapusovega kljunotaja (<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>)
Karate zeon 5 CS (lambda-cihalotrin 5%)	0,15 L na ha	dotikalni insekticid z želodčnim in odvrčnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.	-za zatiranje listnih uši (<i>Aphididae</i>), kljunotaja (<i>Ceutorhynchus</i> spp.) in repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) ter drugih grizočih žuželk
Poleci (deltametrin 2,5 %)	0,3 L/ha	dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe	-za zatiranje repičarja (<i>Meligethes aeneus</i>) in drugih škodljivcev

Pred uporabo posameznih fitofarmaceutskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel **ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmaceutskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.**

Kmetijska svetovalna služba:
Specialistka za varstvo rastlin
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet.