

V Mariboru, 2. 3. 2026

OBVESTILO O ZATIRANJU ČESNOVE MUHE

Obveščamo vas, da so bili že izpolnjeni pogoji za nalet česnove muhe. Pojavlja se zelo zgodaj spomladi, ko so dnevne temperature nad 12°C. Če ima česen več kot dva lista na prostem, potem je potrebno spremljanje in ukrepanje. Odlaganje jajčec lahko pregledujete ob rastlinah česna, kjer so prisotna jajčeca; slika spodaj:



Agrotehnični ukrepi:

- Jesenski česen pred česnovo muho obvarujemo s prekrivanjem rastlin pokrivko. Pokrivanje mora biti izvedeno pred pričetkom odlaganja jajčec.

Kemično zatiranje:

Aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca	registriran v
spinosad 48%	Laser plus	0,2 l/ha	7 dni	- v poru, čebuli, česnu in šalotki na prostem za zmanjševanje številčnosti populacijecvetličnega resarja (<i>Frankliniella occidentalis</i>). Stransko delovanje na česnovo muho
ciantraniliprol 10%	Benevia	0,75 L/ha	14 dni	- čebuli, šalotki in česnu za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja in za zatiranje čebulne muhe. Stransko delovanje na česnovo muho.

lambda-cihalotrin 5%	Karate Zeon 5 SC MANJŠA UPORABA	0,15 l/ha	28 dni	- v čebuli, šalotki in česnu za zatiranje resarjev (Thripidae) ter drugih grizočih in sesajočih žuželk.
-------------------------	--	-----------	--------	---

Priporočamo visoko porabo vode, najmanj 600 l/ha ali pa celo več, pripravek mora namreč priti do zemlje ob steblo, da deluje. pH škropilne brozge naj bo okoli 5,5 – 6,2.

Svetujem tudi dodajanje pripravkov, ki vsebujejo alge ali aminoksiline ali Amalgerol, ne dodajajte pa močil, saj je tu zaželeno, da kapljice zdrsnejo po listih do tal.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel **ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.**

Kmetijska svetovalna služba:
Specialistka za varstvo rastlin
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet.