

V Mariboru, 11. 9. 2025

## OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI

Setev oljne ogrščice je v SV že izvedena. Zatiranje plevelov v posevkih oljne ogrščice lahko opravite glede na termin uporabe herbicida, **ali takoj po setvi pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice**. Preverite navodila za uporabo in upoštevajte primeren termin za zatiranje plevelov.

Za dobro delovanje talnih herbicidov je pomembna **dobra priprava tal brez grud in da je prisotna talna vlaga v tleh za aktiviranje herbicidov**.

Pridelovalci, ki ste vključeni v **KOPOP – Vodni viri** in na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI), upoštevajte seznam dovoljenih herbicidov.

HERBICIDI ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI SO:

| Pripravek                                                                                                      | Odmerek                                                          | Fenološka faza uporabe                                                                                                                                                                                                                  | Za zatiranje                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Devrinol 45 FL</b><br><b>Colzamid</b><br>(napropamid 45%)                                                   | 2,5 l/ha                                                         | <b>Pred setvijo</b> , potrebno ga je zadelati v tla na globino 2 do 5 cm.                                                                                                                                                               | enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela     |
| <b>Angelus,</b><br><b>Centium 36 SC,</b><br><b>Clomate,</b><br><b>Czar,</b><br><b>Chimro</b><br>(klomazon 36%) | 0,33 l/ha<br>0,25 l/ha,<br>0,33 l/ha,<br>0,25 l/ha,<br>0,33 l/ha | <b>Pred vznikom, takoj po setvi posevka</b> , najpozneje tri dni (oz. 5 dni) po setvi oljne ogrščice, v razvojni fazi vznika koreninice iz semena (BBCH 00-05).                                                                         | nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela |
| <b>Teridox 500 EC*</b><br>(dimetaklor 50%)<br><b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>               | 2,0 l/ha                                                         | <b>Pred ali ob vzniku oljne ogrščice</b> . Na isti površini se ga lahko uporablja le vsaka tri leta.                                                                                                                                    | širokolistnega in ozkolistnega plevela                |
| <b>Butisan 400 SC*</b><br>(metazaklor 40%)<br><b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>               | 2,5 l/ha                                                         | <b>Pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice do osmih listov</b> . Pleveli do tretjega lista.<br><b>po setvi pred vznikom gojenih rastlin ali po vzniku gojenih rastlin, najpozneje do faze razvitih osmih listov (BBCH00 - BBCH18)</b> | semenskega širokolistnega in ozkolistnega plevela     |
| <b>Butisan S*</b><br>(metazaklor 50%)                                                                          | 2,0 l/ha, lahko v deljenem odmerku                               | <b>Pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice do osmih listov</b> . Pleveli do tretjega lista.                                                                                                                                           | semenskega širokolistnega in ozkolistnega plevela     |

| <b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Rapsan 500 SC*</b><br>(metazaklor 50%)<br><br><b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>                 | 2,0 L/ha, lahko v deljenem odmerku                               | Od fenološke faze suhega semena do faze, ko hipokotil s kličnimi listi raste proti površini zemlje (BBCH 01-08), ali v fenološki fazi od razvitega prvega do tretjega pravega lista (BBCH 11-13).                                                                                                                                                                                                                                              | za zatiranje širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevla |
| <b>Fuego*</b><br>(metazaklor 50%)<br><br><b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>                         | 1,5 l/ha                                                         | <b>Pred vznikom ali takoj po vzniku</b> oljne ogrščice plevelov in pleveli do 2 listov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | širokolistnega in ozkolistne plevela                              |
| <b>Fuego top*</b><br>(kvinmerak 12,5% + metazaklor 37,5%)<br><br><b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b> | 2 l/ha                                                           | <b>Pred vznikom ali po vzniku</b> oljne ogrščice do največ četrtega lista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | širokolistnega in enoletnega ozkolistnega plevla                  |
| <b>Belkar</b><br>(halauksifen-metil 1%+ pikloram 4,8%)                                                              | 0,25 l/ha<br>0,5 l/ha, lahko tudi v deljenem odmerku 2x 0,25l/ha | <b>Po vzniku oljne ogrščice in plevla</b><br>Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko sta dva lista razvita (BBCH 12), do fenološke faze, ko so razviti štirje listi (BBCH 14); v primeru, da se ponovno pojavijo pleveli, se tretiranje ponovi po 14 dni, (2 x 0,25 l/ha), Ali v enkratnem odmerku 0,5 L na ha. Tretira se jeseni, od fenološke faze, ko je šesti list razvit (BBCH 16), do fenološke faze, ko je osmi list razvit (BBCH 18). | enoletnega širokolistnega plevla                                  |
| <b>Successor 600*</b><br>(petoksamid 60%)<br><br><b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>                 | 2 l/ha                                                           | <b>Pred vznikom</b> oljne ogrščice, če je dovolj talne vlažnosti oziroma <b>po vzniku</b> oljne ogrščice do razvojne faze 4 listov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | širokolistnega in ozkolistnega plevla                             |
| <b>Major 300 SL*</b><br>(klopiralid 30%)<br><br><b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>                  | 0,3-0,4 L/ha                                                     | Tretira se spomladi, od razvojne faze, ko je oljna ogrščica v fazi izdolževanja poganjkov, do faze, ko so prisotni cvetni brsti še obdani z listi (BBCH 30-50).                                                                                                                                                                                                                                                                                | širokolistnega in ozkolistnega plevla                             |
| <b>Clap*</b><br><b>Clap forte*</b><br>(klopiralid 72%)                                                              | 0,4 l/ha<br>0,167 kg/ha                                          | <b>Po vzniku</b> oljne ogrščice od razvojne faze, ko je osem listov razvitih, do faze zelenega brsta, ko so cvetni brsti vidni od zgoraj (BBCH 18-51). Ozimno oljno                                                                                                                                                                                                                                                                            | za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevla                 |

|                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>                                                                      |                                          | ogrščico je dovoljeno tretirati le v spomladanskem času.                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| <b>Lontrel 72 SG*</b><br>(klopíralid 72%)<br><br><b>Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.</b>                     | 0,17 kg/ha                               | <b>Po vzniku</b> v razvojni fazi, ko je prvi list razvit, do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje), vendar, ko so ti še vedno zaprti (BBCH 11- 55); ko je plevel v <b>razvojni fazi 2-6 listov</b>           | za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela                        |
| <b>ZA ZATIRANJE TRAVNIH OZKOLISTNIH PLEVELOV</b>                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| <b>Pripravek</b>                                                                                                        | <b>Odmerek</b>                           | <b>Fenološka faza uporabe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Za zatiranje</b>                                                       |
| <b>Fusilade forte</b><br>(fluazifop-p-butil 15%)<br><b>Fusilade max</b><br><b>Frequent</b><br>(fluazifop-p-butil 12,5%) | 0,8-2 l/ha<br><br>1,6 l/ha<br>2-3 l/ha   | <b>Po vzniku</b> oljne ogrščice in plevelov do faze cvetenja (do BBCH 50).                                                                                                                                                   | Enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke.    |
| <b>Agil 100 EC</b><br><b>Alive</b><br>(propakvizafop 10%)                                                               | 0,75 -1,5 l/ha<br>1,2 l/ha               | <b>Po vzniku</b> oljne ogrščice od dveh pravih listov do cvetenja in plevel od dveh listov do sredine razraščanja.                                                                                                           | Enoletnega in nekaterega večletnega ozkolistnega plevela                  |
| <b>Focus ultra</b><br>(cikloksidim 10%)<br>+močilo DASH                                                                 | 1-4 l/ha                                 | <b>Po vzniku</b> oljne ogrščice od dveh pravih listov do 9 razvitih listov in plevel od dveh listov do konca razraščanja (do 15 cm)                                                                                          | Enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela.                            |
| <b>Quick 5 EC</b><br><b>Digator</b><br><b>Wish top</b><br>(kvizalofop-p-etil 5%)                                        | 1-2 l/ha<br>0,6-1 l/ha<br>0,625-1,7 l/ha | <b>Po vzniku</b> oljne ogrščice, v razvojni fazi od dveh do osmih listov (BBCH 12-18), spomladi pred cvetenjem in plevelov od 2 listov do konca razraščanja.                                                                 | Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela          |
| <b>Targa super</b><br>(kvizalofop-p-etil 5%)                                                                            | 1-2 l/ha                                 | <b>Po vzniku</b> oljne ogrščice in plevelov od 2 listov do konca razraščanja.                                                                                                                                                | Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela          |
| <b>Select super</b><br>(kletodim 12%)                                                                                   | 1 L/ha                                   | Tretira se <b>po vzniku jeseni ali spomladi</b> , oz. od razvojne faze dveh razvitih listov do faze začetka rasti stebila (BBCH 12-30).                                                                                      | za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela ter samosevnih žit |
| <b>Zetrola</b><br>(propakvizafop 10%)                                                                                   | 0,75 – 1,5 l/ha                          | <b>Po vzniku</b> od dveh pravih listov do konca razraščanja (BBCH 12-29) v času jesenskega tretiranja, ter od začetka razraščanja do 9 ali več vidno podaljšanih internodijev (BBCH 21-39) v času spomladanskega tretiranja. | Za samosevna žita, enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela          |

**Prepovedan na najožjem VVO\*-** to so aktivne snovi, ki po vodovarstveni Uredbi niso dovoljene na najožjem vodovarstvenem območju (VVOI).

**Prepovedan v KOPOP-Vodni viri\*** - prepoved velja za kmetovalce, ki so vključeni v program KOPOP v Vodne viri.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO FFS, VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, HRANITI RAČUNE.

Kmetijska svetovalna služba:  
Marjeta Miklavc, univ. dipl. ing. kmet.;  
specialistka za varstvo rastlin