

V Mariboru, 27. 10. 2025

OBVESTILO O VARSTVU OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI TER PREKOMEREN RAZVOJ OGRŠČICE

V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve, prisotne pa so tudi že okužbe s **suho trohnobo stebila ogrščice** (suha trohnoba zelja *Leptosphaeria maculans* = ***Phoma lingam***) in drugih bolezni. Svetujemo vam, da pregledate posevke oljne ogrščice in po potrebi uporabite enega izmed fungicidov.

Priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: **Folicur EW 250** 0,5 l/ha ali **Tebusha 25%EW** 1l/ha ali **Orius 25 EW** 1 l/ha ali **Caramba** 1,2 l/ha ali **Plexeo 1,2 l/ha** ali **Sirena** 1,2 l/ha ali **Score 250** 0,5 l/ha ali **Mavita 250 EC** 0,5 l/ha ali **Propulse** 1l/ha ali **Protendo 300 EC** 0,6 l/ha ali **Pecari 300 EC** 0,6 l/ha ali **Revyona** 1,6 ali **Polyversum 0,1kg/ha**. Odmerek prilagodimo velikosti oljne ogrščice. Za dobro delovanje fungicidov so potrebne dnevne temperature zraka nad 12°C.

Ogrščica najboljšje prezimi v fazi 7 - 8 listov, največ 10 listov, optimalno je 20 - 25 rastlin na m² ter debelina koreninskega vratu 8 - 10 mm. Prevelike rastline so pozimi občutljivejše na mraz, podvržene so mehanskim poškodbam zaradi snega, kar lahko privede do večjega zimskega propadanja rastlin in zmanjšuje pridelek. Uporaba omenjenih fungicidov upočasni jesensko rast oljne ogrščice, jo naredijo močnejšo in dobro pripravljeno za prezimovanje.

Kmetijska svetovalna služba:
Specialistka za varstvo rastlin
Marjeta Miklavc, univ. dipl. inž. kmet.